




# Dexmedetomidina UTIN HMIB



Efeitos analgésicos limitados




Normalmente usada  em combinação com opiáceos pela capacidade de potencializar seus efeitos analgésicos.



Em ventilação mecânica mostrou-se tão seguro quanto ao fentanil e quando associado:

- Menor duração da sedação-analgesia adicional
- Diminuição na dose total de opioides
- Não parece ter impacto no drive respiratório
- Não altera o padrão do eletroencefalograma
- Não afeta a tolerância à alimentação enteral
- Retirada mais rápida da ventilação mecânica



| DOSES PADRONIZADAS                   |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Média efetiva                        | 0,3–0,7 mcg/kg/hora               |
| Dose máxima                          | 1,2 mcg/kg/h                      |
| Intranasal<br>(Procedimentos curtos) | 1 e 1,5 mcg/kg/hora               |
| Retirada                             | 0,1 mcg/kg/h a cada 12 a 24 horas |



Abstinência

|                                                                          |                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fatores de risco:                                                        | Duração do uso<br>Dose acumulada       |                                                                                            |
| Entre 72 a 96h                                                           | Suspensão abrupta e observação por 12h |                                                                                            |
| > 96h                                                                    | Desmame lento (dose de retirada acima) |                                                                                            |
| Situações excepcionais<br>Taquicardia, hipertensão,<br>tremor e agitação | Clonidina oral                         | 0.5-1.0 mcg/kg oral cada 6h Dose máxima: 3-4mcg/kg/h                                       |
|                                                                          |                                        | Diminui 0.25 mcg/kg a cada 6 h<br>Avaliar score de abstinência 24-48 horas (Lipsitz PJ <4) |